

Skogens utvecklingsklasser



Röjning utförs i äldre plantskog. Bild: © Pertti Harstela / Vastavalo.

Utvecklingsklassen beskriver trädbeståndets utvecklingsstadium i fråga om skogsvård och virkesproduktion vid en viss tidpunkt utan att beakta mångfald eller övriga värden. Utvecklingsklassen fastställs utgående från trädbeståndets diameter, ålder, struktur och tidigare skogsbehandling. Naturvårdsträd beaktas inte då man använder beståndskaraktäristika för att bestämma utvecklingsklassen.

Skogens utvecklingsklasser

Skogens utvecklingsklasser

A0–Kalmark: Trädlösa eller nästan trädlösa förnyelseytor efter kalavverkning. Skärmträd och klena träd som inte är utvecklingsdugliga och/eller naturvårdsträd kan förekomma. På kalytan kan även finnas grupper med utvecklingsdugliga plantor som uppkommit på naturlig väg och som till arealen begränsas till några ar. Mängden skärmträd och klena träd är mindre än 5 m²/ha.

S0–Skog i fröträdsställning: Bestånd som avverkats med sikte på naturlig förnyelse av tall eller björk. Huvudträdslaget i fröträdsställningen är tall och björk. Plantuppslaget räcker inte ännu till för att uppfylla förnyelseskyldigheten enligt skogslagen. Antalet fröträd för tall är i allmänhet 50–100 st/ha och för björk 10–20 st/ha.

T1–Yngre plantskog: Plantbestånd vars medelhöjd är lägre än 1,3 meter.

T2–Äldre plantskog: Plantbestånd vars medelhöjd är högre än 1,3 meter. En äldre plantskog har en medeldiameter på under 8 cm på brösthöjd, eller så är övre höjden hos tall och gran under 7 meter och hos björk under 9 meter. Trädens ålder på brösthöjd är i södra Finland högst 50 år och i norra Finland högst 120 år.

Y1–Plantskog med överståndare: Tvåskiktat bestånd med ett utvecklingsdugligt plantbestånd som uppfyller förnyelseskyldigheten enligt skogslagen samt fröträd eller skärmträd. Följande skogsvårdsåtgärd är avverkning av överståndare. Plantbeståndets medeldiameter på brösthöjd är under 8 cm eller så är övre höjden hos tall och gran under 7 meter och hos björk under 9 meter. Överståndarnas eller skärmträdens medelhöjd är i allmänhet minst två gånger plantbeståndets höjd.

02–Klenare gallringsskog: Bestånd vars grundytevägda medeldiameter på brösthöjd är 8–16 cm. I barrträdsdominerade bestånd är övre höjden minst 7 meter och i björkbestånd minst 9 meter. Trädens ålder på brösthöjd är minst 11 år, men högst 120 år i södra Finland och högst 200 år i norra Finland.

03–Grövre gallringsskog: Bestånd vars grundytevägda medeldiameter på brösthöjd är över

16 cm, men som ännu inte klassas som avverkningsmogna. I bestånd, där träden aldrig kommer att nå stockdimension, till exempel på grund av trädslaget eller karg ståndort, fastställs utvecklingsklassen utgående från åldern. Trädens ålder på brösthöjd är minst 25 år.

04–Förnyelse mogen skog: Då skogsägaren har större nytta av att förnya ett skogsbestånd än att låta det växa vidare är det dags att förnya beståndet. Förnyelsemognaden kan bedömas till exempel med hjälp av tabellerna i skogsvårdsrekommendationerna.

05–Skog i skärmställning: Bestånd som avverkats med sikte på naturlig förnyelse av gran. Det naturliga plantuppslaget som redan förekommer eller uppstår skyddas med skärmträd. Även lövträdsdominerade lågskärmar klassas som skog i skärmställning. Plantuppslaget räcker inte ännu till för att uppfylla förnyelseskyldigheten enligt skogslagen. Vid sidan av gran kan också tall eller björk utgöra skärmträd. Skärmträdens antal är i allmänhet 100–300 st/ha.

ER–Olikåldrig skog: Bestånd som är olikåldrigt eller som med skogsvårdsåtgärder omställs till olikåldrigt. Trädbeståndet är olikåldrigt när en tydlig skiktning saknas, och trädbeståndet är fullskiktat med träd av olika ålder och storlek.

Läs mer om ämnet: Skötsel av en skogsfastighet | [Begreppen och klassificeringarna inom skogsvården](#)